



Liguori

CENTRO DIAGNOSTICO

80054 Gragnano (NA) – Via Castellammare n° 221
Tel. 081.8719567 Fax 081-3944256

Tampone vaginale

Modalità di prelievo:

- la paziente deve astenersi da rapporti sessuali nelle 72 ore precedenti l'esame;
- aver cessato terapie antibiotiche da almeno una settimana;
- non aver urinato nelle ultime 3 ore;
- non essere in periodo mestruale.

Il prelievo va eseguito dal fornice posteriore vaginale mediante tamponi sterili previa introduzione di uno speculum bivalve sterile. In età pediatrica può essere eseguito su secrezioni vaginali; in caso di sintomatologia a livello dei genitali esterni può essere indicata l'esecuzione di un tampone vulvare. Inserire il tampone nell'apposito terreno di trasporto.

Il campione biologico deve giungere in laboratorio entro massimo 48 ore, nel frattempo deve essere conservato a 2-8 °C.

E' fortemente consigliato allegare ad ogni tampone vaginale un vetrino effettuato al momento del prelievo. Tale vetrino va allestito facendo ruotare il tampone e lasciando asciugare il materiale all'aria.

Tampone cervicale

Modalità di prelievo:

- la paziente deve astenersi da rapporti sessuali nelle 72 ore precedenti l'esame;
- aver cessato terapie antibiotiche da almeno una settimana;
- non essere in periodo mestruale.

Il prelievo deve essere effettuato a livello endocervicale, previa introduzione di uno speculum bivalve, rimuovendo l'eccesso di muco cervicale mediante un tampone a secco e inserendo un secondo tampone nell'endocervice per almeno 1 cm, ruotando più volte. Inserire il tampone nell'apposito terreno di trasporto e, in caso di invio tardivo, conservare il tampone a temperatura ambiente; in ogni caso deve arrivare in laboratorio entro 48 ore.

Tampone per ricerca specifica Streptococcus agalactiae

Tale ricerca viene effettuata su donne gravide intorno la 35esima-37esima settimana di gestazione; è possibile ricercare questo germe su tampone vaginale (dall'introito vaginale), su tampone rettale o su tampone vagino-rettale (con un unico tampone sterile, dall'introito vaginale strisciare il tampone sul perineo e terminare nel retto).